



Informationsblatt Circumcision **(Beschneidung der Vorhaut)**

Bei Ihrem Sohn ist die Beschneidung der Vorhaut geplant, dieser Eingriff wird in unserer Klinik ambulant durchgeführt, d.h. Sie dürfen mit Ihrem Kind nachmittags wieder nach Hause gehen.

Datum:

Ablauf:

Zunächst erfolgt die ambulante Vorstellung in unserer Sprechstunde mit Überweisung des Kinderarztes bzw. Urologen.

Hier wird die Operation mit Ihnen besprochen und der Termin für das Gespräch mit dem Narkosearzt und für die Operation vereinbart.

Am vereinbarten Termin kommen Sie mit Ihrem Sohn auf die Station S17 (HNO), Hauptgebäude, 1.Obergeschoß (aus dem zentralen Treppenhaus/Fahrrad nach links, am Ende des Ganges hinter der ersten Glaskabine erneut nach links).

Wichtig ist dass Ihr Sohn nüchtern ist, das heißt er darf 6 Stunden vor dem Eingriff nichts mehr essen und zwei Stunden vorher nichts mehr trinken (Milch und Brei bis zu 4 Stunden vor der Operation).

Nach dem Eingriff wird Ihr Kind in den Aufwachbereich gebracht, nachmittags werden Sie dann vom Narkosearzt und Operateur entlassen.

Für den nächsten Tag erhalten Sie einen Termin in unserer Sprechstunde oder bei Ihrem überweisenden Urologen zur Entfernung des Verbandes und Kontrolle der Operationswunde. Die Fäden lösen sich in den nächsten Wochen auf und müssen nicht entfernt werden. Die weiteren Kontrollen übernimmt dann der Kinderarzt bzw. Urologe.

Schmerzen:

Nach der Operation ist die Eichel für einige Tage sehr berührungsempfindlich. Bei stärkeren Schmerzen am OP-Tag kann auch ein Schmerzmittel in der entsprechenden Stärke gegeben werden. Zur besseren Wundheilung empfehlen wir nach der Entfernung des Verbandes regelmäßig Penisbäder mit Kamille (z.B. Kamilleteebeutel in einem Becher) durchzuführen.

Mögliche Probleme:

Bei starken Schmerzen, Blutung, Rötung oder starker Schwellung im Bereich der Wunde stellen Sie sich bitte in unserer Ambulanz vor.